Tome 41, nº 13. — Mars 1934.

Deux Saturnoïdes nouveaux du Muséum de Genève

par

F. LE CERF

Paris.

Avec 2 figures dans le texte.

Dirphia sombrero n. sp.

Coloration générale brun foncé; pas de dessins aux ailes postérieures, ceux des antérieures réduits à trois aires principales: une basale brun roussâtre, étendue jusqu'à la ligne antémédiane; une discale brun foncé uniforme, comprise entre la ligne précédente et l'extramédiane, très large en haut, très rétrécie en bas; une terminale par moitié brun foncé et brun roussâtre.

L'aire basale, couverte de poils, est étroitement et obliquement bordée de brun foncé à la base; la ligne antémédiane est fine, brun noirâtre, bordée de poils blancs du côté interne. Elle commence obliquement à la côte, coupe le milieu de la cellule et descend presque verticalement au bord dorsal, après avoir formé deux dents aiguës sur la cubitale et la nervure 2, une légère saillie sur le pli de 1 *c*, et une dent plus large sur 1 *b*, au-dessous de laquelle elle s'incurve vers la base. Extramédiane également fine, brun foncé, très finement bordée extérieurement de blanc; elle est constituée, de la côte au bord dorsal, par des festons convexes presque réguliers, dont les plus saillants sont entre les nervures 2-4. Le champ terminal est occupé dans sa moitié proximale par une ombre antéterminale brune, plus foncée en dehors, qui double l'aire médiane et en suit à peu près les contours. Elle descend d'abord obliquement de l'apex à la nervure 6, s'incurve entre 6 et 4, puis court parallèlement à l'extramédiane jusqu'au bord dorsal. Pas de

point discocellulaire. Dessous brun rougeâtre assez clair, avec la côte et une trace de ligne extramédiane rectiligne brunâtres.

Ailes postérieures brun noirâtre uniforme, éclairci et légèrement lavé de rougeâtre pâle vers la base. Pas de trait discocellulaire. Dessous brun rougeâtre assez clair, un peu plus foncé à la côte et traversé par une ligne médiane diffuse, un peu sinuée, blanchâtre, bordée de brunâtre pâle de chaque côté. Franges des deux paires

Fig. 1. — *Dirphia sombrero* n. sp., ♂.

brun roussâtre, mêlées de rougeâtre en dessus, plus claires en dessous.

Tête brun foncé, avec les côtés du front brun rougeâtre; palpes brun foncé; antennes jaune roussâtre. Thorax et ptérygodes brun foncé, mêlés de poils brun rougeâtre clair, plus abondants et plus longs sur le métathorax. Abdomen noir en dessus, avec les tergites bordés de brun rougeâtre, plus clair vers la base, plus foncé vers l'extrémité, où se trouvent de longs poils. Dessous du thorax et de l'abdomen brun rougeâtre. Pattes à pilosité brun rougeâtre, avec les hanches antérieures, le dessus des tibias et les tarses brun noirâtre.

Envergure: 95 mm.

Type: 1 ♂ (H. T.), Brésil, Saô Paulo, Muséum de Genève.

C'est au voisinage des *Dirphia avia* Stoll et *avicula* Drdt. que cette espèce paraît devoir se placer. Comme eux, elle est dépourvue de trait discocellulaire; mais elle s'en distingue nettement, outre sa coloration plus foncée, par les lignes anté- et extramédianes dentées ou festonnées, la subterminale mieux définie, et l'absence complète de dessins aux postérieures.

Syssphinx callichroma n. sp.

Ailes antérieures jaune de cadmium, passant graduellement au jaune pâle vers le tornus et le bord dorsal, piquetées de points brun noirâtre, petits, espacés, irrégulièrement distribués, avec une tache basale ovalaire lilas rosé, une ombre discocellulaire arrondie de même couleur, tachée d'un petit point blanc sur l'angle infé-

Fig. 2. — *Syssphinx callichroma* n. sp., ♂.

rieur de la cellule, et une ombre extramédiane oblique, également lilas rosé, dirigée presque en droite ligne de la pointe de l'apex à la nervure 2 où elle s'infléchit pour descendre au bord dorsal. Nette, foncée et entaillée par les nervures à sa partie supérieure, cette bande pâlit, devient linéaire et s'atténue dans sa partie inférieure. Sur la majeure partie de sa longueur, elle se confond avec une ombre terminale de même tonalité, descendant jusqu'à la nervure 2, présentant aussi le même caractère d'effacement graduel d'avant en arrière, de sorte que ces deux dessins ne forment qu'une plage unique, divisée seulement à sa partie inférieure par le fond jaune qui se diffuse jusqu'au-dessus de la nervure 3. Côte

roussâtre, bordée de lilas rosé à la base. Dessous jaune de chrome clair, un peu plus foncé antérieurement, avec la côte brunâtre, la tache discocellulaire réduite, mieux définie, brunâtre, sans point blanc, la zone terminale lilas rosé plus claire et plus courte qu'en dessus.

Ailes postérieures jaune de cadmium, avec tout le champ costal, au-dessus de la nervure 7, brun rougeâtre et un lavis discal de même couleur entre le pli de 1 *c* et la base de la nervure 4. Dessous uniformément jaune de chrome clair, sans dessin. Franges des deux paires concolores.

Tête lilas rosé, à front jaune clair, antennes brun roussâtre clair. Thorax jaune, avec les côtés des patagia, du mésothorax, et les ptérygodes lilas rosé. Abdomen roussâtre en dessus, à premier tergite jaune clair. Dessous du corps et pattes jaune clair.

Envergure: 49 mm.

Type: 1 ♂ (H. T.), Brésil, Ste-Catherine, 1922 (coll. Ch. J. Pitard) Muséum de Genève.

D'après la monographie des Syssphingidés de E. L. Bouvier [1], c'est sans doute près de *S. andrea* Dgn. que cette nouvelle espèce doit prendre place. Elle en diffère par la présence, sur le dessus des ailes antérieures, d'une tache basale lilas, et le ton de la tache discocellulaire, en dessous par la grande réduction des dessins et l'absence de teinte rose au-delà de la tache discocellulaire; aux postérieures, par l'absence de tache prédiscale noirâtre et la présence du rouge brun sur tout le champ costal.

---

[1] *Etude sur les Saturnioïdes normaux, Famille des Syssphingidés*, in: Mém. Acad. Sc. Inst. Fr., 1931.